

Maladie d'Alzheimer

Clinique

Critères diagnostiques DSM IV

- ➔ **Une altération de la mémoire** (altération de la capacité à apprendre des informations nouvelles ou à se rappeler les informations apprises antérieurement)
- ➔ **Une (ou plusieurs) des perturbations cognitives suivantes :**
 - (a) **aphasie** (perturbation du langage)
 - (b) **apraxie**
 - (c) **agnosie**
 - (d) **perturbation des fonctions exécutives** (faire des projets, organiser, ordonner dans le temps ...)
- ➔ **Les déficits cognitifs sont à l'origine d'une altération significative du fonctionnement social ou professionnel et représentent un déclin /au niveau du fonctionnement antérieur.**
- ➔ **L'évolution est caractérisée par un début progressif et un déclin cognitif continu.**

Diagnostic clinique

- ➔ **Entretien avec le patient et la famille**
Le témoignage d'un informateur fiable est essentiel au processus diagnostic

- ➔ **La plainte mnésique est fréquente**
 - *respecter des rendez-vous*
 - *se rappeler des noms*
 - *retrouver son chemin*

- ➔ **Noter tous les changements qui l'accompagnent**
au niveau :
 - **des cognitions**
 - **de la personnalité**
 - **du comportement**
 - **de la vie quotidienne**

- ➔ **Examen neurologique et somatique**

VIE QUOTIDIENNE

➔ ACTIVITES INSTRUMENTALES

Utiliser le téléphone

Faire des courses

Préparer le repas

Faire le ménage / la lessive

Utiliser les transports

Prendre des médicaments

Gérer ses finances

Bricoler & entretenir la maison

➔ SOINS PERSONNELS

Continence

Alimentation

Habillement

Soins personnels

Mobilité

Toilette

Examens complémentaires

Imagerie médicale

Il est recommandé de faire pratiquer

- **scanner** (sans injection de produit de contraste / coupes temporales internes)

Atrophie cortico-sous corticale

- **IRM**

Atrophie hippocampique

- **scintigraphie cérébrale**

hypoperfusion postérieure

Examens biologiques

Il est recommandé de faire pratiquer

- **un hémogramme,**
- **un ionogramme sanguin,**
- **un dosage de la TSH**

Diagnostic différentiel

Drogues **D**émences **D**épression **D**élirium

Démence vasculaire

Maladie des corps de Lewy

Démences fronto-temporales

Démences sous-corticales

(maladie de Parkinson, chorée de Huntington, PSP)

Démences focalisées

Démences toxico-métaboliques

(hyperthyroïdie , carence en vitamine B12)

Infections (syphilis, SIDA, Méningite chronique)

Hydrocéphalie à Pression Normale

Abus / intoxication médicamenteuse

réévaluation de tous les médicaments

- **sédatifs , anticholinergiques, antiparkinsoniens**